

KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Može izazvati neke ozbiljne neželjene efekte koji ponekad mogu postati opasan po život i dovesti do smrti. Ovo se može desiti bilo koje vreme tokom lečenja ili čak nakon završetka lečenja. Možete doživeti više od jednog neželjenog efekta u isto vreme.

Obratite se svom lekaru odmah ako razvijete bilo kakve znake ili simptome, uključujući one koji nisu navedeni na ovoj kartici. Vaš lekar vam može dati druge lekove kako biste sprečili teže komplikacije i smanjili simptome. Vaš lekar može da obustavi sledeću dozu leka KEYTRUDA ili da prekine terapiju lekom KEYTRUDA.

Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu za KEYTRUDA koje sadrži informacije za pacijenta na www.ema.europa.eu.

VAZNO

- Ne pokušavajte sami da dijagnostikujete ili lečite neželjene efekte.
- Nemojte prekidati lečenje sa Keytruda, samo ako ste o tome razgovarali sa svojim lekarom
- **Nosite ovu karticu sa sobom u svakom trenutku**, posebno kada putujete, kad god idete u hitnu pomoć ili kada morate da posetite drugog lekara..
- Obavezno obavestite svakog zdravstvenog radnika da to



Kartica pacijenta

Pluća

- Kratkog daha
- Bol u grudima
- Kašalj

creva

- Dijareja ili češće pražnjenje creva nego obično
- stolice koje su crne, katranaste, lepljive,
- ili sadrže krv ili sluz
- Teški bol ili osetljivost u stomaku
- Mučnina ili povraćanje

Jetra

- Mučnina ili povraćanje
- Osjećaj manje gladi
- Bol na desnoj strani stomaka
- Žutilo kože ili belančevina očiju
- Tamni urin
- Krvarenje ili stvaranje modrice lakse nego normalno
- nego normalno

Bubrezi

- Promene u količini ili boju urina

Hormonske žlezde

- Ubrzani rad srca
- Gubitak ili povećanje telesne težine
- Pojačano znojenje
- Gubitak kose
- Hladno
- Zatvor
- Dublji glas
- Bolovi u mišićima
- Vrtoglavica ili nesvestica
- Glavobolje koje neće nestati ili neuobičajena glavobolja

Dijabetes tipa 1 uključujući dijabetičku ketoacidozu

- Osjećaj više gladi ili žeđi
- Potreba za češćem mokrenjem
- Gubitak težine
- Osjećaj umora ili mučnina
- Bol u želucu
- Brzo i duboko disanje
- Konfuzije
- Neuobičajena pospanost
- Sladak miris na vašem dahu
- Slatki ili metalni okus u ustima
- Drugačiji miris vašeg urina ili znoja

- **Ako primijetite bilo koju nuspojauobratite se svom lekaru, farmaceuta ili medicinskoj sestri. To uključuje sve moguće nuspojave koje nisu navedene u uputsto za lek . Također možete prijaviti nuspojave direktno putem xxxxx.**
- Prijavlivanjem nuspojave možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog leka.

Važne kontakt informacije

Ime doktora

Kancelarijski telefon

Telefon posle radnog vremena

Moje ime

Moj telefon

Kontakt za hitne slučajeve (ime i telefon)

Važne informacije za pružaoce zdravstvenih usluga

Ovaj pacijent se leči lekom KEYTRUDA® (pembrolizumab), koji može izazvati neželjene reakcije imunološki posredovano koje se mogu pojaviti u bilo kom trenutku tokom lečenja ili čak nakon lečenja. Procenite pacijente na znake i simptome neželjenih reakcija imunološki posredovano. Rana dijagnoza i odgovarajući tretman su od suštinskog značaja za minimiziranje svih posledica neželjenih reakcija imunološki posredovano.

Za sumnje na neželjene reakcije povezane sa imunološki posredovano, obezbedite adekvatnu procenu da biste potvrdili etiologiju ili isključili druge uzroke. Na osnovu težine neželjene reakcije, obustavite KEYTRUDA i primenite kortikosteroide. Specifične smernice za lečenje neželjenih reakcija imunološki posredovanodostupne su u Sažetku karakteristika leka za KEYTRUDA.

Konsultacije sa onkologom ili drugim medicinskim specijalistom mogu biti od pomoći za upravljanje neželjenim reakcijama koje su imunološki posredovanosistemom specifičnim za organ.

Molimo pogledajte Sažetak
Karakteristika leka za
KEYTRUDA na
www.ema.europa.eu ili
dpocalbkomac@msd.com
za više informacija

Copyright © 2015 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. ONCO-XXXXXX-XXXX 03/20

