

Kartica Upozorenja za Pacijenta



XANIRVA, 20 mg, film obložene tablete

Držite ovu karticu uvek uz sebe

Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre započinjanja lečenja

Ja sam na antikoagulantnoj terapiji sa lekom XANIRVA (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Telesna težina:

Drugi lekovi/stanja:

U hitnom slučaju, molimo vas obavestite:

Ime lekara:

Telefon lekara:

Pečat lekara:

Molimo vas obavestite:

Ime:

Telefon:

Srodstvo:

- **Informacije za zdravstvene radnike:**
- Vrednosti INR-a ne treba koristiti jer nisu pouzdana mera antikoagulantsne aktivnosti leka XANIRVA.

Šta treba da znam o leku XANIRVA?

- Lek XANIRVA razređuje krv, što sprečava stvaranje opasnih krvnih ugrušaka.
- Lek XANIRVA se mora uzimati tačno onako kako vam je prepisao vaš lekar. Da biste osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, nikada nemojte preskačiti dozu.
- Nemojte prestati da uzimate lek XANIRVA bez prethodnog razgovora sa svojim lekarom, jer se rizik od stvaranja krvnih ugrušaka može povećati.
- Obavestite svog lekara o svim drugim lekovima koje trenutno uzimate, nedavno ste uzimali ili nameravate da počnete da ih uzimate, pre nego što počnete da uzimate lek XANIRVA.
- Obavestite svog lekara da uzimate lek XANIRVA pre bilo kakve operacije ili invazivne procedure.

Kada treba da potražim savet od svog lekara?

Kada uzimam lek za razređivanje krvi kao što je lek XANIRVA važno je da budete svesni njegovih mogućih neželjenih dejstva. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo. Nemojte početi sa uzimanjem leka XANIRVA ako znate da ste pod rizikom, a da se prethodno ne konsultujete sa

svojim lekarom. Odmah obavestite svog lekara ako imate bilo kakve znake ili simptome krvarenja kao što su sledeći:

- bol
- otok ili nelagodnost
- glavobolja, vrtoglavica ili slabost
- neuobičajene modrice, krvarenje iz nosa, krvarenje desni, posekotine kojima je potrebno dugo vreme da se zaustavi krvarenje
- menstrualni tok ili vaginalno krvarenje koje je obilnije nego obično
- krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena ili crna stolica
- iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili materijal koji izgleda kao talog kafe

Kako da uzimam lek XANIRVA?

- Da bi se obezbedila optimalna zaštita, lek XANIRVA 20 mg se mora uzimati sa hranom

Izvori globalnog dokumenta:

- SmPC – for film-coated tablets (CZ/H/0834-0835) and hard capsules (CZ/H/0836-0837) approved 29-Apr-2022.
- RMP – version 2.0 for film-coated tablets (CZ/H/0834-0835, approved 28-Aug-2022) and version 1.2 for hard capsules (CZ/H/0836-0837, approved 22-Mar-2022)
- Educational material of the reference product [Product name]:
 - Kartica sa upozorenjima za pacijenta (Jan-2019)