

YERVOY®

(ipilimumab)

Kartica pacijenta

Ova kartica za pacijenta ispunjava uslove dozvole za stavljanje leka u promet i odobrena je od strane Kosovska Agencija za Lekove i Medicinska Sredstava.

VAŽNE Informacije za Pacijente

Uvek nosite ovu karticu sa sobom zdravstvene radnike da primite monoterapiju lekom YERVOY® samostalno.



Ako imate bilo kakve znakove ili simptome, obavestite svog lekara odmah.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA



Creva i želudac

Dijareja (vodenasta, tečna ili meka stolica), krvava ili tamno obojena stolica, češće pražnjenje creva nego obično, bol ili osetljivost u predelu stomaka ili abdomena, mučnina ili povraćanje



Oko

Crvenilo oka, bol u oku, problemi sa vidom ili замуćen vid



Hormonske žlezde

Ubrzan rad srca, povećano znojenje, povećanje ili gubitak težine, osećaj hladnoće, gubitak kose, zatvor, dublji glas, groznica, umor, glavobolja, vrtoglavica ili nesvestica, osećaj veće gladi ili žeđi nego obično, potreba za češćim mokrenjem ili promene u ponašanju (npr. manji seksualni nagon, razdražljivost ili zaboravnost)



Jetra

Žutilo očiju ili kože (žutica), bol na desnoj strani želuca, tamna koža urin ili krvarenje



Pluća

Kratak dah, kašalj ili bol u grudima



Živci

Slabost mišića, utrnulost ili peckanje u nogama, rukama ili licu, vrtoglavica, gubitak svesti ili teškoće sa buđenjem



Koža

Osip na koži sa ili bez svraba, suva koža, plikovi i/ili ljuštenje kože, rane u ustima, otok lica ili limfnih žlezda

Ostali važni neželjeni efekti:

Teške reakcije na infuziju:

- Reakcije na infuziju ipilimumaba u krvotok mogu se javiti, obično tokom ili u roku od 24 sata od prijema doze.
- Odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako tokom infuzije ipilimumaba dobijete ove simptome: jezu ili drhtavicu, svrab ili osip, crvenilo, otežano disanje, vrtoglavicu, groznicu i osećaj nesvestice.

VAŽNO

- Obavestite svog lekara o svim prethodnim medicinskim stanjima.
- Rano lečenje neželjenih efekata smanjuje verovatnoću da će lečenje ipilimumabom morati biti privremeno ili trajno prekinuto.
- Znaci i simptomi koji mogu izgledati blagi mogu se brzo pogoršati ako se ne leče.
- **NE** pokušavajte sami da lečite ove simptome.

- Znaci i simptomi mogu biti odloženi i mogu se javiti nedeljama do mesecima nakon vaše poslednje injekcije ipilimumaba.

Za dodatne informacije, pročitajte Uputstvo za lek YERVOY®, ili kontaktirajte:

elektronskom poštom, na e-mail adresu:
medinfo.kosovo@swixxbiopharma.com

VAŽNE informacije za Zdravstvene Radnike

- Ovaj pacijent se leči monoterapijom ipilimumabom.
 - Imunološki povezane neželjene reakcije (IrARs) mogu se javiti u bilo kom trenutku tokom lečenja ili mesecima nakon njegovog prekida.
 - Rana dijagnoza i odgovarajuće lečenje su neophodni za minimiziranje komplikacija opasnih po život.
 - Konsultacije sa onkologom ili drugim medicinskim specijalistom mogu biti korisne za lečenje organski specifičnih irARs-ima.
- Zdravstveni radnici trebaju da pogledaju Sažetak karakteristika proizvoda (SmPC) za ipilimumab ili kontaktirajte elektronskom poštom, na e-mail adresu: medinfo.kosovo@swixxbiopharma.com

Zdravstveni radnik koji leči ovog pacijenta sa ipilimumab treba da popuni obrazac 'Kontakt mog doktora' Odeljak "Informacije" ove Kartice za pacijenta.

Kontakt informacije mog doktora

(ko je prepisao ipilimumab)

Ime doktora: _____

Telefon u kancelariji: _____

Telefon nakon radnog vremena: _____

Moji kontakt podaci

Moje ime i telefon _____

Ime i broj telefona njegovatelja (u slučaju nužde)

