

Keytruda® (pembrolizumab)

Kartela e Pacientit

Mund të shkaktojë disa efekte anësore serioze, të cilat ndonjëherë mund të jenë jetë-kërcënuese dhe të çojnë në vdekje. Këto mund të shfaqen në çdo kohë gjatë trajtimit ose edhe pas përfundimit të trajtimit. Mund të përjetoni më shumë se një efekt anësor në të njëjtën kohë.

Kontaktoni menjëherë mjekun tuaj nëse ju shfaqet ndonjë shenjë ose simptomë, përfshirë edhe ato që nuk janë të listuara në këtë kartelë. Mjeku juaj mund t'ju japë barna të tjera për të parandaluar komplikimet më të rënda dhe për të zvogëluar simptomat tuaja. Mjeku juaj mund ta shtyjë dozën e radhës të KEYTRUDA ose ta ndërpresë trajtimin me KEYTRUDA.

Për më informata më të hollësishme, ju lutemi konsultoni Përmbledhjen e Karakteristikave të Produktit për KEYTRUDA në faqen e internetit të EMA-s ose kontaktoni në adresën elektronike dpocalbkomac@msd.com.

Për më shumë informata, konsultoni Fletudhëzimin e KEYTRUDA, që përmban informata për pacientin, në faqen e internetit të Agjencisë Evropiane të Barnave (EMA).

E RËNDËSISHME

- Mos tentoni t'i trajtoni vetë efektet anësore.
- Mos e ndërprisni trajtimin me KEYTRUDA pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj.
- **Mbajeni këtë kartelë gjithmonë me vete**, posaçërisht kur udhëtoni, sa herë që shkoni në urgjencë ose kur duhet të vizitoheni te një mjek tjetër.
- Sigurohuni që ta informoni secilin profesionist shëndetësor që e vizitoni se jeni duke u trajtuar me KEYTRUDA dhe tregojani këtë kartelë.

Kartela e Pacientit

Mushkëritë

- Vështirësi në frymëmarrje
- Dhimbje në gjoks
- Kollë

Zorrët

- Diarre ose jashtëqitje më të shpeshta se zakonisht
- Jashtëqitje të zeza, si thëngjill, ngjitëse ose që përmbajnë gjak apo mukus
- Dhimbje e fortë ose ndjeshmëri në bark
- Nauze ose vjellje

Mëlçia

- Nauze ose vjellje
- pakësim i oreksit
- Dhimbje në anën e djathtë të barkut
- Zverdhje e lëkurës ose e të bardhës së syve
- Urinë me ngjyrë të errët
- Gjakderdhje ose mavijosje më e lehtë se zakonisht

Veshkat

- Ndryshime në sasinë ose ngjyrën e urinës

Gjëndrat hormonale

- Rrahje të shpejta të zemrës
- Humbje ose shtim në peshë
- Djersitje e shtuar
- Rënie e flokëve
- Ndjesi e të ftohtit
- Kapsllëk
- Trashje e zërit
- Dhimbje muskulore
- Marramendje ose të fikët
- Kokëdhimbje që nuk kalon ose kokëdhimbje e pazakonshme

Diabeti tip 1, përfshirë ketoacidozën diabetike

- Ndjesi e shtuar e urisë ose etjes
- Nevojë për të urinuar më shpesh
- Humbje në peshë
- Ndjesi lodhjeje ose nauze
- Dhimbje barku
- Frymëmarrje e shpejtë dhe e thellë
- Konfuzion
- Përgjumje e pazakontshme
- Erë e ëmbël e frymëmarrjes
- Shije e ëmbël ose metalike në gojë
- Erë ndryshe e urinës ose e djersës tuaj

• Nëse ju paraqitet ndonjë efekt anësor, bisedoni me mjekun, farmacistin ose infermierin tuaj. Këtu bëjnë pjesë edhe çdo efekt anësor i mundshëm që nuk është cekur në fletëudhëzimin e paketimit. Efektet anësore mund t'i raportoni gjithashtu drejtpërdrejt në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale në e-mail adresën info@akkpm-rks.gov.

• Përmes raportimit të efekteve anësore, ju mund të ndihmoni në sigurimin e më shumë informatave reth sigurisë e këtij bari.

Informata të rëndësishme të kontaktit

Emri i Mjekut

Numri i telefonit të ordinancës

Telefoni pas orari të punës

Emri im

Numri im i telefonit

Kontakti emergjent (Emri dhe numri i telefonit)

Informata të rëndësishme për profesionistët shëndetësor

Ky pacient është duke u trajtuar me KEYTRUDA® (pembrolizumab), që mund të shkaktojë reaksione anësore të ndërmjetësuara nga sistemi imun, të cilat mund të paraqiten në çdo moment gjatë trajtimit ose edhe pas përfundimit të trajtimit. Vlerësoni pacientët për shenja dhe simptoma të reaksioneve anësore të ndërmjetësuara nga sistemi imun. Diagnostikimi i hershëm dhe menaxhimi i duhur janë thelbësorë për të minimizuar pasojat e reaksioneve anësore të ndërmjetësuara nga sistemi imun.

Në rast të dyshimit për reaksione të padëshirueshme të ndërmjetësuara nga sistemi imun, sigurohuni që të kryhet vlerësimi i duhur për të konfirmuar etiologjinë ose për të përjashtuar shkaqe të tjera. Varësisht nga ashpërsia e reaksioneve të padëshirueshme, ndërprisni përkohësisht trajtimin me KEYTRUDA dhe administroni kortikosteroide. Udhëzimet specifike për menaxhimin e reaksioneve të padëshirueshme të ndërmjetësuara nga sistemi imun janë të disponueshme në Përmbledhjen e Karakteristikave të Produktit për KEYTRUDA.

Konsultimi me një onkolog ose me një mjek tjetër specialist mund të jetë i dobishëm për menaxhimin e reaksioneve të padëshirueshme të ndërmjetësuara nga sistemi imun, specifike për organe të caktuara.